

## BIJSLUITER

**Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.**

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

### Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Locoid Crème en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Locoid Crème gebruikt
3. Hoe wordt Locoid Crème gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Locoid Crème?

Locoid® Crème, crème 1 mg/g  
Hydrocortison-17-butyraat

- Het werkzame bestanddeel is 1 mg hydrocortison-17-butyraat per gram crème.
- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn vloeibare cetostearylalcohol, macrogol 25 cetostearyl ether, vloeibare paraffine, witte vaseline, propylparahydroxybenzoaat (E 216), butylparahydroxybenzoaat, citroenzuur (E 330), natriumcitraat (E 331) en gezuiverd water.

Registratiehouder:

Astellas Pharma B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Telefoon: 071-5455854

Telefax: 071-5455850

Fabrikant:

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

In het register ingeschreven onder:

RVG 05911

### **1. WAT IS LOCOID CRÈME EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?**

#### **Hoe ziet Locoid Crème eruit en hoe is het verpakt?**

Locoid Crème is wit en is verpakt in tubes van 15, 30 of 100 gram. De tube zit in een geel/grijs/witte verpakking met opdruk Locoid Crème, crème 1 mg/g. Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

#### **Hoe werkt Locoid Crème?**

Locoid Crème bevat een synthetisch bijnierschorshormoon (= corticosteroid) en vermindert snel de ziekteverschijnselen, zoals jeuk, roodheid of schilfering van de huid, die optreden bij bepaalde huidaandoeningen.

Corticosteroiden nemen in het algemeen niet de oorzaak van de verschijnselen weg.  
De crème basis zorgt ervoor dat de huidaanandoening minder vochtig wordt.

### **Waarvoor kan Locoid Crème gebruikt worden?**

Locoid Crème kan gebruikt worden bij de behandeling van oppervlakkige huidaanandoeningen waarbij er vaak sprake is van jeuk, roodheid of schilfering.

Locoid Crème bevat weinig vet en is daardoor geschikt bij die huidaanandoeningen waarbij de huid rood en nat is.

## **2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LOCOID CRÈME GEBRUIKT**

### **Gebruik Locoid Crème niet**

- Wanneer uw huidaanandoening wordt veroorzaakt door infecties met bacteriën, virussen, schimmels, gisten of parasieten. Deze aandoeningen zouden kunnen verergeren of niet meer opgemerkt worden.
- Voor (jeugd)puistjes, ook met roodheid van de huid.
- Voor wonden of geschubde huid (ichthyosis).
- Wanneer uw huidaanandoening het gevolg kan zijn van eerdere behandeling met corticosteroiden, zoals ontsteking van de huid rond de mond, dunne huid, eventueel met strepen, kwetsbare bloedvaatjes.
- Bij huiduitslag op de voetsool bij kinderen.
- Wanneer u overgevoelig bent voor hydrocortison-17-butyraat of één van de hulpstoffen (wat zelden voorkomt). Zie ook de rubriek 'Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Locoid Crème'.

### **Wees extra voorzichtig met Locoid Crème**

- Wanneer u de gezichtshuid, de huid van de geslachtsdelen en huidplooien met Locoid Crème wil behandelen, omdat deze delen van de huid bijzonder gevoelig zijn voor corticosteroiden.
- Wanneer u Locoid Crème gebruikt onder een afsluitend verband, op grote huidoppervlakken of bij kinderen. Controle door uw arts is dan noodzakelijk.
- Locoid Crème mag niet worden aangebracht in het oog of op de oogleden.
- Langdurige toepassing van corticosteroiden op grote oppervlakken bij kinderen moet worden vermeden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is.

Als na het stoppen van een langdurige behandeling met Locoid Crème de huidaanandoening snel terugkomt, dient u uw arts te raadplegen.

### **Zwangerschap**

Als corticosteroiden in hoge doseringen worden ingenomen of ingespoten dan kan onder meer de groei van het ongeboren kind worden vertraagd. Aangezien er bij toepassing van Locoid crème op de huid maar weinig van de werkzame stof in het bloed komt, kan Locoid crème kortdurend en op kleine delen van de huid worden toegepast. Bij langdurig gebruik en bij toepassing op grote delen van de huid kan zo'n effect op voorhand niet worden uitgesloten. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Als u Locoid Crème wilt gebruiken tijdens zwangerschap, dan dient u dit te overleggen met uw arts.

### **Borstvoeding**

Tijdens het geven van borstvoeding kan Locoid crème kortdurend en op kleine delen van de huid worden gebruikt. In het geval van langdurig gebruik of bij toepassing op grote delen van de huid wordt het geven van borstvoeding ontraden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Als u Locoid Crème wilt gebruiken tijdens het geven van borstvoeding, dan dient u dit te overleggen met uw arts.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Er zijn geen gegevens bekend van het effect van Locoid Crème op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen, maar invloed van Locoid Crème is niet te verwachten.

### **Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Locoid Crème**

Cetostearyl alcohol kan plaatselijk huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis) en propyl- en butylparahydroxybenzoaat kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

### **Gebruik van Locoid Crème in combinatie met andere geneesmiddelen**

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

## **3. HOE WORDT LOCOID CRÈME GEBRUIKT?**

Locoid Crème dient u in een dun laagje op de te behandelen huidaandoening aan te brengen. Na het aanbrengen kunt u Locoid Crème met een lichte massage in de huid laten opnemen. Niet vaker dan 1 tot 3 keer per dag op de huidaandoening aanbrengen, tenzij uw arts anders voorschrijft.

Als uw klachten zijn verminderd kan uw arts zonodig voorschrijven om Locoid Crème minder vaak te gebruiken. In het algemeen dient u niet meer dan 1 à 2 tubes van 30 gram Locoid Crème per week te gebruiken. Soms zal uw arts voorschrijven om Locoid Crème af te wisselen met Locoid Oleogel of Locoid Vetcrème en omgekeerd.

### **Wat moet u doen als u te veel Locoid Crème heeft gebruikt?**

Wanneer u te veel Locoid Crème heeft gebruikt, kunnen de verschijnselen zoals vermeld onder bijwerkingen optreden. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

### **Wat moet u doen wanneer u vergeten bent Locoid Crème te gebruiken?**

Als u Locoid Crème een keer vergeet aan te brengen, kunt u gewoon verder gaan met Locoid Crème zoals u gewend bent. Het is niet noodzakelijk om alsnog extra Locoid Crème aan te brengen.

### **Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Locoid Crème wordt gestopt:**

Wanneer de behandeling met Locoid Crème voortijdig wordt gestaakt, kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren. Overleg daarom altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

## **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals alle geneesmiddelen kan Locoid Crème bijwerkingen veroorzaken. Bij gebruik van Locoid Crème zouden de volgende bijwerkingen kunnen optreden:

#### *Immuunsysteemaandoeningen*

Zeer zelden komen voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

- Overgevoeligheid

#### *Hormonale aandoeningen*

Zelden komen voor (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

- Remming van de bijnierschors

Bij langdurig gebruik kunnen corticosteroïden die op de huid worden aangebracht, door de huid heen gaan en in het bloed terechtkomen. Dit kan leiden tot remming van de bijnierschors. De kans op deze bijwerkingen is het grootst bij:

- toepassing onder afsluiting (onder plastic, in huidplooiën)
- toepassing op grote huidoppervlakken
- langdurig gebruik
- toepassing bij kinderen

#### *Oogaandoeningen*

Zeer zelden komen voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

- Verhoging van de druk in het oog met een verhoogde kans op grijze staar (cataract).

#### *Huid- en onderhuidaandoeningen*

Zelden komen voor (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

- Brandend of jeukend gevoel van de met Locoid Crème behandelde huid. Dit is meestal niet ernstig en gaat vanzelf over.
- Verkleuring of dunner worden van de huid (vaak onherstelbaar), soms met striemen (striae), verwijding van de bloedvaatjes in de huid, overmatige haargroei (hypertrichose).
- Verergering van de aandoening na staken van de behandeling ('rebound-effect').
- Uitslag, puistjes of pusvorming, als u Locoid Crème lang achtereen gebruikt of toepast onder een afsluitend verband.
- Eczeem en huidontsteking (dermatitis), inclusief huidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis).

Als u last krijgt van één van bovenstaande bijwerkingen, dient u uw arts te waarschuwen.

In het geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

## **5. HOE BEWAART U LOCOID CREME?**

Locoid Crème buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar in de oorspronkelijke verpakking en niet boven 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Gebruik Locoid Crème niet meer na de datum op de verpakking achter 'EXP'.

**Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd op: januari 2013**