

Publieksbijsluiter VERMOX

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat.

Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u VERMOX zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.

- *Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.*
- *Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig heeft.*
- *Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of na een aantal dagen niet verbeteren.*

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is VERMOX en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u VERMOX gebruikt.
3. Hoe wordt VERMOX gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u VERMOX?
6. Aanvullende informatie

Naam van het geneesmiddel**VERMOX 100 mg tabletten****VERMOX 20 mg/ml suspensie voor oraal gebruik**

De werkzame stof is mebendazole.

VERMOX tabletten bevatten 100 mg mebendazole (R 17 635) per tablet.

Andere bestanddelen zijn microkristallijn cellulose, talk, maïszetmeel, natriumcarboxymethylamylaat, natriumsaccharine, magnesiumstearaat, gehydrogeneerde katoenzaadolie, oranjeschilolie, siliciumdioxide, natriumlaurylsulfaat, oranjegeel S (E 110).

VERMOX suspensie voor oraal gebruik bevat 20 mg mebendazole (R 17 635) per ml suspensie.

Andere bestanddelen zijn microkristallijn cellulose, methylcellulose, natriumcarboxymethylcellulose, saccharose, natriumlaurylsulfaat, methylparahydroxybenzoesaat, propylparahydroxybenzoesaat, bananenaroma, citroenzuur, gezuiverd water.

Registratiehouder

Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
2340 Beerse, België

FabrikantTabletten

Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
2340 Beerse, België

of

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica SA
Estrada Consiglieri Pedroso 69-B Queluz
2730-055 Barcarena, Portugal

Suspensie voor oraal gebruik

Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse, België

of
Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
2340 Beerse, België

Registratienummer

VERMOX tabletten: BE001057

VERMOX suspensie voor oraal gebruik: BE101324

1. WAT IS VERMOX EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Tabletten om in te nemen door de mond:

De tabletten zijn beschikbaar in een doordrukverpakking met 6 of 10 tabletten.

Suspensie voor oraal gebruik om in te nemen door de mond:

De suspensie voor oraal gebruik is beschikbaar in een flesje met 30 ml drinkbare suspensie (met plastieken doseerdop van 5 ml).

VERMOX is een middel tegen worminfecties

VERMOX is aangewezen bij de behandeling van infecties met één of meerdere wormsoorten:

- aarsworm (*Enterobius vermicularis*);
- spoelworm (*Ascaris lumbricoides*);
- zweepworm (*Trichuris trichuria*);
- mijnworm (*Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*);
- lintworm (*Taenia* spp.);
- draadworm (*Strongyloides stercoralis*).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U VERMOX GEBRUIKT**Gebruik VERMOX niet:**

- als u overgevoelig bent voor mebendazole of voor één van de andere bestanddelen van VERMOX. Deze overgevoeligheid kan worden herkend aan huiduitslag, jeuk, kortademigheid en/of een gezwollen gezicht. Stop dan de behandeling en raadpleeg uw arts.

Pas goed op met VERMOX:

- als het wordt toegediend aan kinderen jonger dan 2 jaar. VERMOX mag alleen aan jonge kinderen van minder dan 2 jaar worden toegediend als de wormbesmetting een duidelijke invloed heeft op de voedingstoestand of de lichamelijke ontwikkeling van het kind. Raadpleeg in elk geval eerst uw arts.
- als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik van VERMOX in combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen.

Gebruik van VERMOX in combinatie met voedsel en drank

Niet van toepassing

Zwangerschap

Vooraf tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap moeten de voordelen van VERMOX afgewogen worden tegen de mogelijke risico's.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.

Borstvoeding

In de periode waarin u borstvoeding geeft, moet u voorzichtig zijn met het innemen van VERMOX.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

VERMOX heeft geen invloed op de geschiktheid om een voertuig te besturen of machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van VERMOX

Niet van toepassing

Gebruik van VERMOX in combinatie met andere geneesmiddelen

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

- Als u gelijktijdig cimetidine (een geneesmiddel tegen maagzuur) moet innemen, moet u uw arts waarschuwen. Hij zal de passende maatregelen nemen en de nodige dosisaanpassingen uitvoeren.
- Gelijktijdig gebruik van VERMOX en metronidazole (een geneesmiddel tegen bacteriële en protozoa infecties) moet worden vermeden.

3. HOE WORDT VERMOX GEBRUIKT?

Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Hoeveel VERMOX u moet innemen, hangt af van de wormsoort waarmee u besmet bent. Als u twijfelt, raadpleeg dan uw arts.

1. Aarswormen (*Enterobius vermicularis*):

1 enkele tablet of 5 ml (= 1 doseerdop) drinkbare suspensie.

Alle leden van het gezin moeten gelijktijdig worden behandeld en moeten deze behandeling na 2 tot 4 weken nog eens herhalen (opnieuw 1 tablet of 5 ml drinkbare suspensie voor alle gezinsleden). Dat is nodig voor een doeltreffende behandeling: de eerste inname doodt al de wormen maar niet hun eieren, die een nieuwe infectie kunnen veroorzaken.

De dosering geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen.

2. Spoelwormen, zweepwormen, mijnwormen en menginfecties:

1 tablet of 5 ml (= 1 doseerdop) drinkbare suspensie 's morgens en 's avonds, gedurende drie dagen.

De dosering geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen.

3. Lintwormen en draadwormen:

** volwassenen:*

2 tot 3 tabletten of 10 tot 15 ml (= 2 tot 3 doseerdoppen) drinkbare suspensie 's morgens en 's avonds, gedurende drie dagen.

** kinderen ouder dan 2 jaar:*


1 tablet of 5 ml (= 1 doseerdop) drinkbare suspensie 's morgens en 's avonds, gedurende drie dagen.

Voor kinderen jonger dan 2 jaar: zie rubriek "Pas goed op met Vermox".

Als u een behandeling met VERMOX toepast, hoeft u geen speciaal dieet te volgen en geen middel in te nemen dat de ontlasting bevordert.

De tablet(ten) innemen met een weinig water. De suspensie schudden vóór gebruik.

De fles dient als volgt te worden geopend: duw de plastieken schroefdop naar beneden terwijl u tegen de wijzers van de klok in draait (zie figuur).

**Wat u moet doen wanneer u VERMOX vergeet te gebruiken**

Niet van toepassing.

Verschuiven die u kunt verwachten wanneer de behandeling met VERMOX wordt gestopt

Niet van toepassing.

Wat u moet doen als u meer van VERMOX heeft gebruikt dan zou mogen

Wanneer u teveel van VERMOX heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

De inname van een te grote hoeveelheid VERMOX levert weinig gevaren op. In het ergste geval kunnen darmkrampen, braken en diarree of hoofdpijn en duizeligheid optreden. Bij langdurig gebruik van grote hoeveelheden kan de functie van de lever worden verstoord.

Als één van die tekens bij u optreedt, moet u uw arts op de hoogte brengen. Toedienen van actieve kool kan nuttig zijn.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan VERMOX bijwerkingen hebben.

VERMOX wordt goed verdragen en bij de voorgeschreven hoeveelheden zijn er weinig bijwerkingen te verwachten. De volgende bijwerkingen kunnen soms echter optreden:

- kort durende maagpijn en diarree kunnen soms voorkomen, vooral als u een ernstige worminfectie heeft. In dat geval kunt u VERMOX blijven innemen volgens de aanwijzingen.
- Overgevoeligheid voor VERMOX komt zeer zelden voor. Dit kan bijvoorbeeld herkend worden door huiduitslag, jeuk, kortademigheid of een gezwollen gezicht. Als één van deze symptomen zich voordoet, stopt u met de inname van VERMOX en neemt u contact op met uw arts.
- Zeer zelden werd een ernstige huidaandoening met huiduitslag, blaren op de huid en zweren in de mond, ogen of het anogenitale gebied samen met koorts gemeld. Als u deze symptomen opmerkt, neemt u onmiddellijk contact op met uw arts.
- Zeer zelden kunnen convulsies (stuipen) optreden bij zuigelingen. VERMOX mag alleen worden toegediend aan kinderen jonger dan 1 jaar als uw arts dat heeft voorgeschreven.
- Zeer zelden kunnen zich problemen voordoen met bloed, lever en nieren bij langdurig gebruik van VERMOX bij doses die aanzienlijk hoger liggen dan de aanbevolen doses (veel hoger dan normaal voorgeschreven).

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiters is vermeld en die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U VERMOX?

VERMOX wordt bij kamertemperatuur (15-30°C) en buiten invloed van het licht bewaard. VERMOX buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uiterste gebruiksdatum

De afkorting "exp." op de verpakking betekent dat het geneesmiddel vervalst op de laatste dag van de maand die na de afkorting vermeld staat (maand en jaartal).

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.

Afleveringswijze

VERMOX tabletten en suspensie voor oraal gebruik zijn vrij van medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 04/2020.